

Versión 001
Fecha 30/07/2026

Nombre del producto
VERDANE®

Características del producto

Insecticida de origen natural para control de orugas y trips

Verdane® es un producto para el control de insectos, cuya sustancia activa, spinosad, se obtiene de forma natural por fermentación de un organismo del suelo, la bacteria *Saccharopolyspora spinosa*. Actúa por ingestión, contacto y tiene acción translaminar.

Composición

Spinosad, 48% p/v
Contiene 1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5).

Clasificación del modo de acción de la sustancia activa según IRAC:

GRUPO	5	INSECTICIDA
--------------	----------	--------------------

Nº de registro

Inscrito en R.O.P.F. con el nº N° ES-01948

Formulación

Suspensión concentrada (SC)

Presentación

Categoría	Formato	Uds.	Uds./palet
Insecticidas	1 L	12 L	600 L
	200ml	24 L	2200 L

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Recomendaciones de uso

PREPARACIÓN DEL CALDO:

Llenar el tanque de pulverización hasta la mitad con agua limpia y poner en marcha el sistema de agitación. Agitar bien el envase y verter la cantidad necesaria de producto al tanque de pulverización. Añadir la cantidad necesaria de aceite. Acabar de llenar con agua el tanque de pulverización, manteniendo el sistema de agitación en funcionamiento hasta el final de la pulverización.

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Acelga, Espinaca	Lepidópteros; Trips	20	1	--	1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89.
Ajo	Lepidópteros; Mosca del vinagre de alas manchadas, (<i>Drosophila suzukii</i>); Trips	20-25	2	8 días	500-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 15-49.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Alcachofa	Lepidópteros	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 30-59.
Algodonero	Lepidópteros	100-150	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,15 L/ha. BBCH 51-59 y 69-79. Comenzar los tratamientos cuando se inicie la eclosión de los huevos.
Apio	Lepidópteros; Trips	20-25	1	--	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Exclusivamente para cultivos para producción de hoja de apio. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 30-59.
Barbarea, Canónigo, Perejil, Perifollo, Rúcula, Verdolaga	Lepidópteros; Trips	20-25	1	--	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Berenjena	Trips	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89.
Berro de agua	Lepidópteros; Trips	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-49.
Berro, Mastuerzo	Lepidópteros; Trips	20-25	1	--	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-49.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Calabacín	Lepidópteros; Mosca de la calabaza, (<i>Dacus frontalis</i>); Trips	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. <i>Invernadero:</i> Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola	Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89.
Calabaza, Melón	Lepidópteros; Mosca de la calabaza, (<i>Dacus frontalis</i>)	20-25	2	7 días	800-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor <i>Invernadero:</i> Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89.
	Trips	20-25	2	7 días	800-1000		Calabaza uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Cebolla	Trips	0,2 L/ha	2	8 días	500-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	BBCH 15-49.
Cebolleta, Cebollino, Chalote	Coleópteros; Lepidópteros	20-25	2	8 días	500-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 15-49.
Fresal	Lepidópteros; Mosca del vinagre de alas manchadas, (<i>Drosophila suzukii</i>); Trips	20-25	1	--	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Guisante verde	Lepidópteros; Trips	20-25	1	--	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Guisantes con y sin vaina. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 15-59 y 69-79.
Haba verde, Judía verde	Lepidópteros; Trips	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. <i>Invernadero:</i> Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 15-59 y 69-79. En invernadero: BBCH 15-79.
Hortícolas	Coleópteros	0,2 L/ha	1	--	500-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en prefloración hasta BBCH 59.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Judía forrajera, Judía para grano	Lepidópteros	20-25	2	7 días	800-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,2 L/ha. BBCH 15-59 y 69-79.
Lechuga	Lepidópteros; Trips	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89.
Leguminosas de grano, Leguminosas forrajeras	Apion del guisante, (<i>Holotrichapion pisi</i>); Curculiónidos, (<i>Curculionidae</i>)	0,2 L/ha	1	--	500-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en prefloración hasta BBCH 59.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Maíz	Lepidópteros	0,2 L/ha	2	10 días	800-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. <i>Invernadero:</i> Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola	Indicado en plantas para producción de semillas de maíz. Aplicar hasta BBCH 59 evitando la floración.
Maíz dulce	Lepidópteros; Piral del maíz, (<i>O.nubilalis</i>); Tallados del maíz, (<i>Sesamia spp.</i>)	0,1 L/ha	2	14 días	800-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. BCCH 50-59 y 69-79.
Mostaza china	Lepidópteros; Pulgilla de la col, (<i>Phyllotreta spp.</i>); Trips	20-25	1	--	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-49.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Ornamentales herbáceas	Lepidópteros; Trips	20-25	1	--	500-1000	Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Exclusivamente para cultivos para obtención de flores comestibles. Dosis máxima: 0,2 L/ha. Hasta BBCH 59.
	Coleópteros	20-25	1	--	500-1000		Exclusivamente para cultivos para producción de semillas. Dosis máxima: 0,2 L/ha. Hasta BBCH 59.
Patata	Escarabajo de la patata, (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	50-75	3	7 días	1000-1250	Aire libre: Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Dosis máxima: 0,075 L/ha. BBCH 31-49.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Pepino	Mosca de la calabaza, (<i>Dacus frontalis</i>) ; Trips	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. <i>Invernadero:</i> Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola	Uso menor por Jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89
Pimiento, Tomate	Lepidópteros; Trips, (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. <i>Invernadero:</i> Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola	Dosis máxima: 0,25 L/ha. BBCH 14-59 y 69-89. En invernadero: BBCH 14-89.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Uso	Agente	Dosis (mL/hL)	Nº de aplicaciones	Intervalos	Volumen de caldo (L/ha)	Ámbito y método de aplicación	Forma y época de aplicación (Condic. específico)
Puerro	Trips	0,2 L/ha	2	9 días	500-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Uso menor por Jerarquía de cultivos. BBCH 15-49.
Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera	Lixus, (<i>Lixus spp.</i>)	0,2 L/ha	1	--	500-1000	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor	Indicado en plantas para la producción de semillas. Remolacha de mesa y forrajera: Uso menor por Jerarquía de cultivos. Hasta BBCH 59.
Sandía	Lepidópteros; Mosca de la calabaza, (<i>Dacus frontalis</i>)	20-25	2	7 días	1000-1250	<i>Aire libre:</i> Manual con lanza o pistola, Manual con mochila y Pulverización normal con tractor. <i>Invernadero:</i> Cañón pulverizador, Carretilla, Ins. Fijas automatizadas y Manual con lanza o pistola	Dosis máxima: 0,25 L/ha. Hasta BBCH 59.

(*) Con respecto a los usos menores autorizados y tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Plazo de seguridad

Cultivos	Plazo de seguridad (días)
Fresal	1
Acelga, Apio, Barbarea, Berenjena, Berro de agua, Berro, Mastuerzo, Calabacín, Calabaza, Canónigo, Espinaca, Lechuga, Melón, Mostaza china, Pepino, Perejil, Perifollo, Pimiento, Rúcula, Sandía, Tomate, Verdolaga	3
Ajo, Alcachofa, Cebolla, Cebolleta, Cebollino, Chalote, Guisante verde, Haba verde, Judía forrajera, Judía para grano, Judía verde, Patata, Puerro	7
Maíz	10
Maíz dulce	14
Algodonero	21
Hortícolas, Leguminosas de grano, Leguminosas forrajeras, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera	No procede
Ornamentales herbáceas	Producción de semilla: No procede Flores comestibles: 3

Modo de empleo

CONDICIONAMINETOS GENERALES:

- Tratamiento insecticida al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar según el cuadro de usos autorizados.
- Aplicar al inicio de la infestación.
- Adaptar el volumen de caldo en la aplicación para que nunca se supere el máximo de dosis por hectárea establecido.
- Para el uso contra trips en los cultivos Melón y Puerro, en el período de llegada de insectos adultos a la parcela, antes de la aplicación del producto se deberá aplicar primero un tratamiento con un producto especializado que tenga un fuerte efecto de choque.
- Producto peligroso para las abejas y otros insectos polinizadores. Se prohíben los tratamientos durante el período de floración y durante el período de producción de exudados (por ejemplo, la producción de mielatos después de los ataques de pulgones). Cuando hay plantas en flor o en período de producción de exudados en la parcela (en el caso de bandas con cubierta vegetal), sus partes aéreas deben destruirse o hacerse poco atractivas para las abejas antes del tratamiento (cortándolas, arrancándolas o con la eliminación selectiva de hierbas del cultivo).
- Spa 1: A efectos de prevenir la aparición de resistencias, no efectuar con este producto ni con ningún producto que contenga spinosad, más de 3 tratamientos por período vegetativo, espaciados 7-14 días.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**ATENCIÓN****UFI: S5PW-X4YD-Y50W-MDWP**

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P391: Recoger el vertido.

P501: Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

EUH208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento (UE) nº 547/2011):**Medidas básicas de actuación:**

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES, Tel. 915 620 420. En ambos casos, tenga a mano el envase o la etiqueta

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard

Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACION:**Seguridad del aplicador:***Aire libre*

El aplicador deberá utilizar durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o en su defecto tipo 6.
- Ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.
- Pantalla facial.

El aplicador deberá utilizar durante la aplicación:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o en su defecto tipo 6.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

Invernadero

El aplicador deberá utilizar durante la mezcla/carga para pulverización foliar manual con lanza/pistola:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C3 o en su defecto tipo 3.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.
- EPR tipo FFP1 o P1.
- Pantalla facial.

El aplicador deberá utilizar durante la aplicación para pulverización foliar manual con lanza/pistola:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C3 o en su defecto tipo 3.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

El aplicador deberá utilizar durante la mezcla/carga para pulverización foliar con carretilla, instalaciones automatizadas y cañón desde el exterior:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.
- Ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.
- Pantalla facial.

El aplicador deberá utilizar durante la aplicación para pulverización foliar con carretilla, instalaciones automatizadas y cañón desde el exterior:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

Seguridad del trabajador:

El trabajador utilizará durante la reentrada a los cultivos al aire libre e invernadero:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o ropa de trabajo.
- Calzado cerrado.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard

Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Medidas adicionales de la mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- La recolección del Maíz deberá ser exclusivamente mediante medios mecanizados.
- Los guantes de protección química en el caso del trabajador serán necesarios siempre que haya que entrar en contacto con el cultivo tratado.

SPo5: Ventilar las zonas/los invernaderos tratados (bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar

MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES:

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial, para cultivos al aire libre de:

- 20 m en Ajo, Berenjena, Calabaza, Calabacín, Cebolla, Cebolleta, Cebollino, Chalote, Fresal, Guisante verde, Haba verde, Hortícolas (para producción de semillas), Judía forrajera, Judía para grano, Judía verde, Leguminosas de grano (para producción de semillas), Leguminosas forrajeras (para producción de semillas), Melón, Ornamentales herbáceas (para producción de semillas y para obtención de flores comestibles), Pepino, Pimiento, Puerro, Sandía, Tomate.
- 10 m o bien 5 m junto con el uso de boquillas de reducción de deriva del 90% para su uso en Acelga, Alcachofa, Algodonero, Apio, Barbarea, Berro de agua, Berro, Mastuerzo, Canónigo, Espinaca, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Lechuga, Maíz dulce, Mostaza china, Patata, Perejil, Perifollo, Rúcula y Verdolaga.
- 5 m en Maíz (para producción de semillas), Remolacha azucarera (para producción de semillas), Remolacha de mesa (para producción de semillas) y Remolacha forrajera (para producción de semillas).

SPe 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta la zona no cultivada de:

- 5 m en Guisante verde, Haba verde, Hortícolas (para producción de semillas), Judía forrajera, Judía para grano, Judía verde, Leguminosas de grano (para producción de semillas), Leguminosas forrajeras (para producción de semillas), Maíz (para producción de semillas), Ornamentales herbáceas (para producción de semillas y para obtención de flores comestibles), Remolacha azucarera (para producción de semillas), Remolacha de mesa (para producción de semillas) y Remolacha forrajera (para producción de semillas).

SPe 8: Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración. Elimínense las malas hierbas antes de su floración.

SPe 8: No introducir colonias de insectos auxiliares en los invernaderos o túneles tratados con el producto.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard

Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Eliminación Producto y/o caldo:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU RECIPIENTE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de las aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de agua de las explotaciones o de los caminos).

ADVERTENCIAS AL USUARIO:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

GESTIÓN DE ENVASES:

Prohibido reutilizar el envase. Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes