



COMPOSICIÓN (% p/p):

Nitrógeno total (N):	3,00 %
Nitrógeno orgánico (N):	1,05 %
Potasio (K ₂ O) soluble en agua:	9,00 %
Aminoácidos libres de origen vegetal	4,00 %

pH: 5,0 - 6,0

Densidad: 1,12 – 1,16 g/cc

LÍQUIDO SOLUBLE (SL)

Fertilizante según RD. 506/2013 sobre productos fertilizantes y modificaciones posteriores. (4.1.02)



PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN

VITALIX® es un fertilizante que proporciona nutrientes esenciales y aminoácidos libres, para proporcionar un crecimiento más rápido y vigoroso del cultivo, mayor producción y cosechas de calidad, obteniendo el máximo del potencial genético de la variedad del cultivo.

VITALIX® estimula directamente el metabolismo secundario junto con varias rutas enzimáticas esenciales como la formación de vitaminas, el fortalecimiento de la estructura vegetal y la respuesta ante distintos tipos de estrés.

APLICACIONES Y USOS RECOMENDADOS

VITALIX® está indicado para su empleo por vía foliar en plantaciones agrícolas y en el ámbito profesional de los campos deportivos, parques y jardines. Se emplea para aportar Boro y corregir las carencias y fisiopatías de los cultivos asociadas a éstas, y como fortificante de las plantas, al potenciar y mejorar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios (insecticidas y fungicidas) frente a agresiones causadas por algunos insectos y hongos externos.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Dosis general: 2 L/ha

Cereales y cultivos de leguminosas: **Aplicación foliar:** 0.3-1 L/ha. Se recomienda de 1 a 2 aplicaciones en un intervalo de 30-60 días. *Compatible en mezclas con herbicidas, aplicación recomendada durante períodos desfavorables*

Hortícolas en invernadero: **Aplicación foliar:** 0.5-2 L/ha. Realizar de 1 a 6 aplicaciones en un intervalo de 7-15 días. **Aplicación Radicular:** 2-5 L/ha. Realizar de 1-6 aplicaciones en un intervalo de 10-15 días. *Se recomienda su aplicación desde el trasplante y durante todo el ciclo del cultivo, sobretodo durante períodos desfavorables.*

Hortícolas en campo abierto: **Aplicación foliar:** 0.5-2 L/ha. Realizar de 1 a 4 aplicaciones en un intervalo de 15-30 días. **Aplicación Radicular:** 2-5 L/ha. Realizar de 1-6 aplicaciones en un intervalo de 15-30 días. *Se recomienda su aplicación desde el trasplante y durante todo el ciclo del cultivo, sobretodo durante períodos desfavorables*

Vegetales de raíz, tubérculos y bulbos: **Aplicación foliar:** 1-2 L/ha. **Aplicación radicular:** 2-5 L/ha Desde la siembra y durante todo el ciclo del cultivo. Realizar de 1-4 aplicaciones cada 15-30 días.

Leñosos: **Aplicación foliar:** 1-2 L/ha. **Aplicación radicular:** 2-5 L/ha Durante todo el ciclo del cultivo. Realizar de 1-6 aplicaciones cada 7-15 días.

Parral y uva de mesa: **Aplicación foliar:** 1-2 L/ha. **Aplicación radicular:** 2-5 L/ha Desde la siembra y durante todo el ciclo del cultivo. Realizar de 1-4 aplicaciones cada 7-15 días.

Berries: **Aplicación foliar:** 1-2 L/ha. **Aplicación radicular:** 1-3 L/ha Desde el trasplante y durante todo el ciclo del cultivo. Realizar de 1-6 aplicaciones cada 7-15 días.

Se recomienda tratar a partir del trasplante y durante todo el ciclo del cultivo, con especial atención a períodos desfavorables.

UTILIDAD EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

VITALIX® puede ser incluido en programas de Manejo Integrado de plagas, en cualquier sistema productivo y de certificación de la calidad (A. Ecológica, GlobalGap, P. Integrada, P. Controlada, etc.), y en agricultura convencional. Es una buena herramienta para incorporar a programas de manejo de resistencias.